



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl
centrala: (012) 261-88-00

ULOTKA INFORMACYJNA

MROŻONY KONCENTRAT KRwinek PŁYTKOWYCH (MKKP)

- 1. Wytwórca:** Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
- 2. Opis:**

Rozmrożony Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany jest po rozmrożeniu KKP uprzednio zamrożonego przy użyciu płynu kriochronnego. Mrożeniu poddaje się zarówno koncentraty z aferezy jak i zlewane z kożuchów leukocyтарno – płytkowych.

Skład koncentratu to płytki krwi zawieszane w osoczu .

Objętość waha się w granicach 200-250 ml.
- 3. Opakowanie:**

Opakowanie KKP rozmrożonego stanowi jeden z pojemników z zestawu do separacji automatycznej lub pojemnik transferowy. Nie wykonuje się porcji pediatrycznych.
- 4. Oznakowanie:**

Pojemnik z Rozmrożonym Koncentratem Krwinek Płytkowych posiada:

 - a) etykietę główną zgodną za standardem ISBT 128 zawierającą następujące informacje:
 - numer donacji (w postaci cyfrowej i kodu kreskowego)
 - miejsce wytwarzania (nazwę i adres wytwórcy)
 - nazwę składnika krwi oraz jego kod (w postaci literowo cyfrowej oraz kreskowej)
 - objętość składnika krwi
 - uwagi dotyczące warunków przechowywania i przetaczania
 - grupę krwi układu AB0 i Rh (w postaci literowej, słownej i kodu kreskowego)
 - datę pobrania, preparatyki oraz datę i godzinę ważności (kod daty ważności)
 - zapis o uzyskaniu ujemnych wyników obowiązujących badań kwalifikacyjnych oraz pieczętkę numeryczną osoby potwierdzającej zgodność danych.
 - b) etykietę kontroli serologicznej zawierającą grupę krwi układu AB0 i Rh, jeżeli KKP uzyskano techniką aferezy, oraz kod numeryczny osoby potwierdzającej zgodność danych.
- 5. Warunki przechowywania i transportu. Termin ważności:**

Rozmrożony Koncentrat Krwinek Płytkowych jest ważny przez 2 godziny od momentu zakończenia rozmrożenia. Powinien być transportowany w temperaturze 22 ± 2^0 C, przetaczany przez zestaw z filtrem 170-200 μ m natychmiast po otrzymaniu, nie dłużej niż 1/2 godziny.
- 6. Wskazania: stosować w razie braku świeżych KKP z aferezy lub zlewanych z kożuchów leukocyтарno – płytkowych.**
 - małopłytkowość (< 10 000/ μ l) i towarzyszące jej objawy skazy krwotocznej.
 - małopłytkowość u chorych przygotowywanych do zabiegu operacyjnego (< 50 000/ μ l)
 - wrodzone i nabyte zaburzenia funkcji płytek

W szczególnych przypadkach na zlecenie lekarza prowadzącego - magazynowanie mrożonych KKP pobranych od dobranych dawców dla:

 - noworodków i płodów z małopłytkowością alloimmunologiczną
 - chorych zimmunizowanych antygenami HLA i HPA
 - pacjentów po przeszczepieniu szpiku, (CMV -)

7. Możliwe powikłania:

- niehemolityczne reakcje poprzetoczeniowe (głównie dreszcze, gorączka, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne)
- alloimmunizacja (antygenami HLA i swoistymi dla płytek krwi HPA)
- przeniesienie zakażenia kiłą
- przeniesienie zakażenia wirusowego (WZW, HIV, CMV, itp)
- przeniesienie zakażenia pierwotniakami (malaria)
- małopłytkowa plamica poprzetoczeniowa (PTP)
- poprzetoczeniowa ostra niewydolność oddechowa (TRALI)
- choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi” (GvHD)
- posocznica spowodowana mimowolnym zakażeniem bakteryjnym RKKP
- przeniesienie zakażenia innymi czynnikami zakaźnymi , które nie są badane lub rozpoznane.

8. Data opracowania ulotki:

20.10.2008